




## I Référence Pantone U : noir

Format à plat :	Format plié :
150 x 352 mm	MLE : 150 x 23 mm VDR : NA

**STAMARIL**

Poudre et solvant pour suspension injectable en seringue préremplie

**VACCIN DE LA FIEVRE JAUNE (VIVANT)**

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de vous faire vacciner ou de faire vacciner votre enfant.

- Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre.
- Si l'un des effets indésirables devient sérieux ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien, voir rubrique 4.

## Dans cette notice :

- 1. Qu'est-ce que STAMARIL, et dans quels cas est-il utilisé ?
- 2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser STAMARIL ?
- 3. Comment utiliser STAMARIL ?
- 4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
- 5. Comment conserver STAMARIL ?
- 6. Informations supplémentaires

## 1. QU'EST-CE QUE STAMARIL ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

STAMARIL est un vaccin qui protège contre une maladie infectieuse grave appelée fièvre jaune. La fièvre jaune est présente dans certaines régions du monde et elle se transmet à l'homme par piqûres de moustiques infectés.

STAMARIL est administré aux personnes :

- qui voyagent vers une zone où la fièvre jaune est présente, qui la traversent ou qui y résident.
- qui se rendent dans des pays nécessitant, à l'entrée, un Certificat International de Vaccination ; cela peut dépendre des pays visités précédemment au cours du même voyage.
- susceptibles de manipuler du matériel infecté (comme le personnel de laboratoire).

Pour obtenir un certificat de vaccination contre la fièvre jaune, il est nécessaire d'être vacciné dans un centre de vaccination approuvé afin qu'un Certificat International de Vaccination soit émis. Ce certificat est valide à partir du 10ème jour et jusqu'à 10 mois après la première dose de vaccin. Les certificats émis après une vaccination de rappel sont valides immédiatement après l'injection (voir rubrique 3 ci-dessous).

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER STAMARIL ?

Il est important de prévenir votre médecin ou votre infirmier/ère si l'un des points ci-dessous s'applique à la personne recevant le vaccin. Si vous ne comprenez pas quelque chose, demandez à votre médecin ou votre infirmier/ère de vous l'expliquer.

STAMARIL ne doit pas être administré si vous ou votre enfant :

- êtes allergique aux œufs, aux protéines de poulet ou à tout autre composant de STAMARIL,
- avez présenté une réaction grave suite à une injection d'un vaccin de la fièvre jaune,
- avez un système immunitaire défaillant ou affaibli pour quelque raison que ce soit, comme une maladie, ou un traitement médical (par exemple corticoïdes ou chimiothérapie),
- avez un système immunitaire affaibli par une infection à VIH. Votre médecin vous dira si vous pouvez tout de même recevoir STAMARIL sur la base de vos examens sanguins.

## Posologie

STAMARIL is given as a single, 0.5 millilitre dose to adults and children from 6 months of age. The first dose should be given at least 10 days before being at risk of infection with yellow fever, because it takes 10 days for the first dose of vaccine to work and provide good protection against the yellow fever virus. The protection provided by this dose will last 10 years.

A booster dose (0.5 millilitre) is recommended every 10 years if you are still thought to be at risk of infection with yellow fever (e.g. you still travel to or are living in areas where yellow fever can be caught or could be infected through your work).

If you have any further questions on the use of this vaccine, ask your doctor.

## 4. POSSIBLES SIDE EFFECTS

Like all medicines, STAMARIL can cause side effects, although not everybody gets them.

## Serious side effects

The following serious side effects have sometimes been reported:

## Allergic reactions

- Rash, itching or hives on the skin.
- Swelling of the face, lips, tongue or other parts of the body.
- Difficulty swallowing or breathing.
- Loss of consciousness.

## Reactions affecting the brain and nerves

These may occur within one month of the vaccination and have sometimes been fatal.

Symptoms include:

- High fever with headache and confusion.
- Extreme tiredness.
- Stiff neck.
- Inflammation of brain and nerve tissues.
- Fits.
- Loss of movement or feeling affecting certain parts or all of the body.

## Serious reaction affecting vital organs

This may occur within 10 days of the vaccination and may have a fatal outcome. The reaction can resemble an infection with the yellow fever virus. It generally begins with feeling tired, fever, headache, muscle pain and sometimes low blood pressure. It may then go on to a severe muscle and liver disorders, drops in number of some types of blood cells resulting in unusual bruising or bleeding and increased risk of infections, and loss of normal functioning of the kidneys and lungs.

If you experience ANY of the above symptoms contact your doctor IMMEDIATELY.

## Other side effects

Very common side effects (reported by more than 1 in 10 people)

Problems around the injection site (such as redness, bruising, pain or discomfort, swelling or appearance of a hard lump) and headache.

## Common side effects (reported by less than 1 in 10 people)

Felling or being sick, diarrhoea, muscle pains, fever and weakness.

## Uncommon side effects (reported by less than 1 in 100 people)

Painful joints and stomach pains.

Other possible side effects include:

Swollen glands.

## Reporting of side effects

If you get any side effects, talk to your doctor, pharmacist or nurse. This includes any possible side effects not listed in this leaflet. By reporting side effects, you can help provide more information on the safety of this medicine.

## 5. HOW TO STORE STAMARIL

Keep out of the reach and sight of children.

Do not use STAMARIL after the expiry date which is stated on the carton. The expiry date refers to the last day of that month.

Store in a refrigerator between 2°C and 8°C. Do not freeze.

Keep the vial and syringe in the outer carton in order to protect from light.

Use immediately after reconstitution.

• êtes infecté par le VIH et présentez des symptômes actifs de cette infection,

• avez des antécédents de problèmes de thymus ou si vous ou votre enfant avez subi une ablation du thymus pour quelque raison que ce soit,

• présentez une maladie accompagnée de fièvre ou d'une infection aiguë. La vaccination sera repoussée jusqu'à ce que vous soyez rétabli,

• êtes âgés de moins de 6 mois.

## Fautes attention avec STAMARIL :

- si vous avez plus de 60 ans, car vous présentez un risque accru de développer certains types de réactions sévères mais rares aux vaccins, (y compris des réactions graves affectant le cerveau et les nerfs, ainsi que les organes vitaux, voir rubrique 4). Vous ne recevez le vaccin que si le risque d'infection par le virus est avéré dans les pays où vous allez séjourner,
- si votre enfant est âgé de 6 à 9 mois. STAMARIL peut être administré aux enfants âgés de 6 à 9 mois seulement dans des conditions particulières et sur la base des recommandations officielles en vigueur,
- si vous êtes infecté par le VIH mais que vous ne présentez pas de symptômes de cette infection, votre médecin vous prescrira si vous pouvez recevoir STAMARIL sur la base de vos examens sanguins.
- si votre enfant est également infecté par le VIH (SIDA). Le médecin aura besoin de pratiquer des examens spécifiques et d'obtenir un avis spécialisé avant de vous faire savoir si l'enfant peut recevoir STAMARIL.
- si vous présentez des troubles sanguins (comme l'hémophilie ou un faible taux de plaquettes) ou si vous prenez des médicaments réduisant la coagulation sanguine. Vous pouvez toutefois recevoir STAMARIL à condition qu'il soit injecté sous la peau et non dans le muscle (voir rubrique 3).

## Utilisation d'autres médicaments

Si vous prenez ou avez récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Si vous avez pris récemment un traitement ou un médicament ayant affaibli votre système immunitaire, la vaccination doit être reportée jusqu'à ce que les résultats de vos analyses montrent que votre système immunitaire est redevenu normal. Votre médecin vous informera du moment auquel vous pourrez faire vacciner en toute sécurité.

STAMARIL peut être administré en même temps que le vaccin contre la rougeole, les vaccins typhoïdiques (comme la valence polysoplique Vi) et/ou les vaccins de l'hépatite A.

## Grossesse et allaitement

Veillez dire à votre médecin ou infirmier/ère si vous êtes enceinte, si vous pensez que vous pourrez être enceinte ou si vous alliez, votre médecin ou votre infirmier/ère peut vous dire s'il est indispensable de vous faire vacciner.

Informations importantes concernant certains composants de STAMARIL :

STAMARIL contient une faible quantité de sorbitol. Le vaccin ne doit pas être donné aux personnes souffrant d'une intolérance au fructose.

## 3. COMMENT UTILISER STAMARIL ?

STAMARIL s'administre par injection effectuée par un médecin ou une infirmier/ère. Il s'injecte en règle générale sous la peau mais peut être administré dans un muscle en accord avec les recommandations officielles du pays dans lequel vous vivez.

Le vaccin ne doit pas être injecté dans un vaisseau sanguin.

## Posologie

STAMARIL s'administre en une seule dose de 0.5 millilitre aux adultes et aux enfants à partir de l'âge de 6 mois. La première dose doit être administrée au moins 10 jours avant d'être en situation de risque d'infection car il faut 10 jours pour que la première dose de vaccin soit efficace et confère une bonne protection contre le virus de la fièvre jaune. Cette dose vous protégera pendant 10 ans.

Une dose de rappel (0.5 millilitre) est recommandée tous les 10 ans, à partir de 10 mois si vous êtes toujours considéré(e) comme étant à risque d'infection par la fièvre jaune (par exemple si vous voyagez toujours dans des régions où l'on peut contracter la fièvre jaune, si vous y résidez ou si vous pouvez être infecté(e) dans le cadre de votre travail).

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce vaccin, parlez-en avec votre médecin.

## 4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, STAMARIL peut provoquer des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

## Effets indésirables graves

Tes effets indésirables graves suivants ont quelques fois été rapportés :

## Réactions allergiques

- Eruption cutanée, démangeaisons ou urticaire.
- Difficulté de vision, des lèvres, de la langue et d'autres parties du corps.
- Difficulté pour avaler ou respirer.
- Perte de conscience.

## Réactions touchant le cerveau et les nerfs

Ces dernières peuvent survenir dans le mois suivant la vaccination et ont parfois été mortelles.

Les symptômes peuvent être les suivants :

- Forte fièvre accompagnée de maux de tête et de confusion.
- Extrême fatigue.
- Raideur de la nuque.
- Inflammation au niveau du cerveau et des tissus nerveux.

## Réactions touchant le cœur et les organes vitaux

Ces dernières peuvent survenir dans le mois suivant la vaccination et ont parfois été mortelles.

Les symptômes peuvent être les suivants :

- Forte fièvre accompagnée de maux de tête et de confusion.
- Extrême fatigue.
- Raideur de la nuque.
- Inflammation au niveau du cerveau et des tissus nerveux.

## Réaction grave touchant les organes vitaux

Cette dernière peut survenir dans les 10 jours suivant la vaccination et peut être mortelle. La réaction peut ressembler à une infection par le virus de la fièvre jaune. Elle débute en général par une sensation de fatigue, de fièvre, des maux de tête, des douleurs musculaires et parfois une baisse de tension.

Elle peut alors évoluer vers des troubles sévères des muscles et du foie, une chute du nombre de certaines cellules sanguines provoquant un choc ou un saignement inhabituels, ainsi qu'un risque accru d'infections et un mauvais fonctionnement des reins ou des poumons.

## Autres utilisations de STAMARIL

Si vous ressentez UN SEUL des symptômes mentionnés ci-dessus, contactez IMMEDIATEMENT votre médecin.

## Autres effets indésirables

## Effets indésirables très fréquents (rapportés par plus d'une personne sur 10)

Problèmes autour du point d'injection (tels que rougeurs, bleus, douleurs ou inconfort, gonflement ou apparition d'une petite bulle d'eau) et maux de tête.

## Effets indésirables fréquents (rapportés par moins d'une personne sur 10)

Nausées ou vomissements, diarrhée, douleurs musculaires, fièvre et fièvres.

## Effets indésirables peu fréquents (rapportés par moins d'une personne sur 100)

Articulations douloureuses et douleurs d'estomac.

## Autres effets indésirables possibles :

## Déclaration des effets secondaires

## Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, votre pharmacien ou à votre infirmier/ère. Ceci signifie aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

## 5. COMMENT CONSERVER STAMARIL ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser STAMARIL après la date de péremption mentionnée sur la boîte. La date de péremption fait référence au dernier jour du mois.

A conserver au réfrigérateur (entre 2°C et 8°C). Ne pas congeler.

Conserver le flacon et la seringue dans l'emballage extérieur à l'abri de la lumière.

Utiliser immédiatement après reconstitution.

Les médicaments ne doivent pas être jetés à l'eau ou jetés au sol.

Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettent de protéger l'environnement.

## 6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

## Que contient STAMARIL ?

Substance active :